


# Avertissements agricoles



ISSN 0759-9616

PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR



MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DIRECTION DE LA QUALITÉ  
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

B.P. 95 - 84140 MONTFAVET

Téléphone (90) 88.21.83

- ARBORICULTURE - CULTURES LEGUMIERES - GRANDES CULTURES -

Le 15 Juillet 1986

VAR - SPECIAL ARBORICULTURE

## MOUCHE NOIRE DE LA FIGUE -

La protection doit commencer immédiatement dans la région de Solliès-Pont, La Valette, et dans les zones similaires en précocité.

Utiliser =

			Délais
fenthion	50	g M.A./hl (Lebaycid)	7
phosphamidon	30	g M.A./hl (Dimécron)	21
ou deltaméthrine	1,25	g M.A./hl (Décis)	0

Renouveler tous les 15 jours jusqu'au délai d'emploi avant récolte.

Le Décis est à réserver à l'approche de la récolte car il est sans limitation d'emploi. Toutefois, son pouvoir curatif est faible sur les asticots; il agit surtout sur les adultes. Par ailleurs, son emploi favorise les *acaridés*.

Le fenthion et le phosphamidon sont à utiliser en début de protection: ils sont curatifs sur les asticots présents au moment du traitement et préventifs pour les éclosions à venir.

-----0000-----

P64